

Localizzazione e Aree di Interesse Naturalistico

Sito	Status di Protezione	Peculiarità
Provincia di Udine		
Media Valle del Tagliamento	IBA IT048 (Friuli Venezia Giulia)	Area caratterizzata dalla presenza di coppie nidificanti.
Prealpi Carniche	IBA IT047 (Friuli Venezia Giulia)	Area caratterizzata dalla presenza di coppie nidificanti.
Dolomiti Friulane	SIC/ZPS IT3310001 Parco Naturale Regionale (Friuli Venezia Giulia)	Habitat prioritari (es. le mughete) e non, specie endemiche e rare (es. <i>Gentiana froelichii</i> Jan ex Rchb. ssp. <i>zenarii</i> , etc.), specie avifaunistiche. Particolarmente notevoli: la fauna a chiroteri (<i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Myotis bechsteini</i> , <i>Myotis blythii</i> , etc., varie popolazioni di <i>Iberolacerta horvathi</i> , di <i>Salamandra atra</i> e di <i>Martes martes</i> ; popolazioni di <i>Eliomys quercinus</i> , <i>Bombina variegata</i> , <i>Ursus arctos</i> e <i>Lynx</i> . Nelle acque correnti vivono popolazioni di <i>Cottus gobio</i> e <i>Austropotamobius pallipes</i> .
Col Gentile	SIC IT3320008 (Friuli Venezia Giulia)	Habitat in buono stato di conservazione (stazione di <i>Eryngium alpinum</i> L. e di <i>Erigeron atticus</i> Vill.) Area alpina di rilevanza ornitologica elevata. Notevoli popolazioni di <i>Salamandra atra</i> e <i>Martes martes</i> .
Monti Verzegnis e Valcalda	SIC IT3320011 (Friuli Venezia Giulia)	Habitat in buono stato di conservazione (specialmente faggete e praterie subalpine su calcare) e molte specie endemiche (es. <i>Bupleurum longifolium</i> L. subsp. <i>vapicense</i> Sourkora). Area prealpina di rilevanza ornitologica nazionale. Discrete popolazioni di <i>Martes martes</i> , <i>Ursus arctos</i> , <i>Lynx lynx</i> , <i>Rosalia alpina</i> e <i>Cerambyx cerdo</i> . Nelle acque correnti è diffuso <i>Cottus gobio</i> . <i>Salmo</i> [trutta] <i>marmoratus</i> può risalire l'altissimo corso dell'Arzino.
Valle Medio Tagliamento	SIC IT3320015 (Friuli Venezia Giulia)	Stazioni eterotropiche di leccio. Area prealpina di notevole rilevanza ornitologica. Frequenti <i>Vipera ammodytes</i> e <i>Natrix tessellata</i> , <i>Mustela putorius</i> , <i>Hyla intermedia</i> e <i>Triturus carnifex</i> . Presente la più grossa nursery regionale di <i>Miniopterups schreibersii</i> , <i>Myotis myotis</i> e <i>Myotis blythii</i> . Segnalati <i>Vertigo angustior</i> , <i>Lucanus cervus</i> e <i>Austropotamobius pallipes</i> .
Greto del Tagliamento	SIC IT3310007 (Friuli Venezia Giulia)	Vegetazione pioniera. Presenza di specie ornitologiche rare (es. <i>Burhinus oedicephalus</i>). Invertebrati (<i>Lucanus cervus</i>), anfibi (<i>Rana latastei</i> , <i>Bombina variegata</i> , <i>Bufo viridis</i>). Le acque del Tagliamento ospitano <i>Barbus plebejus</i> , <i>Cottus gobio</i> . Piccole rogge ospitano <i>Austropotamobius pallipes</i> .

Localizzazione e Aree di Interesse Naturalistico

Sito	Status di Protezione	Peculiarità
Provincia di Pordenone		
Prealpi Carniche	IBA IT047 (Friuli Venezia Giulia)	Area caratterizzata dalla presenza di coppie nidificanti.
Magredi di Pordenone	IBA IT053 ZPS IT3311001 (Friuli Venezia Giulia)	Stazioni di <i>Brassica glabrescens</i> Poldini e <i>Crambe tataria</i> Sebeok, popolazioni di <i>Podarcis sicula</i> . Sito ornitologico di rilevanza primaria per dimensioni e presenza di specie rare (es. <i>Burhinus oedicephalus</i> , ecc.). Presenza di <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Circaetus gallicus</i> e <i>Milvus migrans</i> . Fra gli anfibi: <i>Bombina variegata</i> , <i>Triturus carnifex</i> , <i>Bufo viridis</i> e popolazione eterotopica di <i>Triturus alpestris</i> (S. Leonardo Valcellina); fra gli insetti <i>Euplagia quadripunctaria</i> e <i>Proserpinus proserpina</i> ; tra i mammiferi <i>Suncus etruscus</i> . <i>Cottus gobio</i> è presente nelle rogge della zona.
Forra del Torrente Cellina	SIC IT3310004 (Friuli Venezia Giulia)	Popolazioni rilevanti di tasso. Sito ornitologicamente rilevante. Nella zona sono segnalati <i>Austropotamobius pallipes</i> e <i>Vertigo angustior</i> . Ancora segnalata ma rarissima <i>Salmo marmoratus</i> . Nei dintorni è stato da poco segnalato <i>Felis silvestris</i> . Alla grotta Vecchia Diga sono segnalati <i>Miniopterus schreibersi</i> e diverse specie endemiche del genere <i>Orotrechus</i> , che qui hanno la loro Terra typica.
Magredi del Cellina	SIC IT3310009 (Friuli Venezia Giulia)	Stazioni di <i>Brassica glabrescens</i> Poldini e di <i>Crambe tataria</i> Sebeok. Popolazioni di <i>Podarcis sicula</i> . Sito ornitologico di rilevanza primaria per dimensioni e presenza di specie rare (es. <i>Burhinus oedicephalus</i> , ecc.). Presenza di <i>Aquila chrysaetos</i> e <i>Circaetus gallicus</i> in area di pianura; presenza di <i>Milvus migrans</i> e altri rapaci. Fra gli anfibi: <i>Bombina variegata</i> , <i>Triturus carnifex</i> , <i>Bufo viridis</i> e una popolazione eterotopica di <i>Triturus alpestris</i> (S. Leonardo Valcellina). Fra gli insetti: <i>Euplagia quadripunctaria</i> e <i>Proserpinus proserpina</i> . Tra i mammiferi: <i>Suncus etruscus</i> . <i>Cottus gobio</i> è presente nelle rogge della zona.
Risorgive del Vinchiaruzzo	SIC IT3310010 (Friuli Venezia Giulia)	Numerose specie di uccelli (es. <i>Circus pygargus</i> nidificante). Nell'area è ben diffuso <i>Austropotamobius pallipes</i> , che qui convive con <i>Cottus gobio</i> e <i>Lethenteron zandreae</i> . Sono ben diffuse <i>Triturus carnifex</i> , <i>Rana latastei</i> , <i>Emys orbicularis</i> , <i>Bombina variegata</i> . <i>Zootoca vivipara</i> ssp. <i>carniolica</i> è abbastanza comune. Presenza di <i>Plecotus macrobullaris</i> e <i>Osmoderma eremita</i> .

Localizzazione e Aree di Interesse Naturalistico

Sito	Status di Protezione	Peculiarità
Prealpi carniche		
Carso	IBA IT066 (Friuli Venezia Giulia)	Area caratterizzata dalla presenza di coppie nidificanti.
Aree carsiche della Venezia Giulia	ZPS IT3341002 (Friuli Venezia Giulia)	Numerosi habitat prioritari. Numerosissime le specie significative e di pregio, molte delle quali endemiche e/o di Lista Rossa nazionale.
Carso Triestino e Goriziano	SIC IT3340006 (Friuli Venezia Giulia)	Sulle falesie di Duino concentrazione di specie stenomediterranee ed endemiche oltre che di <i>Urospermum picroides</i> e <i>Reichardia picroides</i> . Nell'area dei laghi di Doberdò e Pietrarossa presenti stazioni di specie rare sia termofili sia di umidità quali <i>Lens ervoides</i> , <i>Asterolinon linumstellatum</i> , ecc. Concentrate ben cinque specie di <i>Potamogeton</i> (<i>P. cripsus</i> , <i>P. lucens</i> , <i>P. nodosus</i>). Sito importante dal punto di vista faunistico (<i>Hyla arborea</i> , <i>Rana ridibunda</i> , ecc.). Diffuso e localmente piuttosto comune <i>Proteus anguinus</i> , vertebrato stigobio di importanza prioritaria (dal 2003). Nei macereti è frequente <i>Chionomys nivalis</i> . Presenti <i>Lucanus cervus</i> e <i>Morimus funereus</i> , mentre esistono alcune vecchie segnalazioni di <i>Osmoderma eremita</i> .
Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa	Riserva Naturale Regionale (Friuli Venezia Giulia)	L'area è caratterizzata da due grandi depressioni carsiche, parzialmente riempite dal lago di Doberdò e dal lago di Pietrarossa, che costituiscono uno dei pochi esempi di lago-stagno carsico in Europa. Nei periodi di magra degli affluenti il livello delle acque cala molto e la superficie libera, non occupata dal canneto, si limita a canali e a pozze. La biodiversità sia animale sia vegetale è molto accentuata per la coesistenza di diversi ambienti naturali quali landa e boscaglia carsica e associazioni acquatiche. Il paesaggio vegetale è caratterizzato da tipi pascolivi. Nel sito sono presenti stazioni di specie rare sia termofile sia igrofile. Da segnalare inoltre <i>Ranunculus illyricus</i> - rara specie sudesteuropea e recentemente confermata e la nordillirica <i>Anemone trifolia</i> . Il particolare tipo di ambiente consente la vita a comunità di diverso tipo.